

Bijwerking

De meest frequente bijwerking is het tijdelijk ontstaan van droge ogen omdat de oogleden minder goed sluiten. Dit kan lokale irritatie en milde visusklachten geven. Hiervoor worden kunsttranen en/of zalf voorgeschreven.

Kostprijs

De ingreep wordt in specifieke gevallen terugbetaald. Afhankelijk van enkele (technische) onderzoeken zal uw ingreep wel/of niet gedeeltelijk bekostigd worden door uw mutualiteit. De **startprijs bedraagt 750 euro**.

Ooglidcorrectie

Last van hangende oogleden of wallen onder je ogen? Met een ooglidcorrectie krijg je weer een open en frisse uitstraling.

HCB

Wenst u contact op te nemen?

CONTACT

Telefonisch kan u ons steeds bereiken op alle weekdays van 8 tot 20u op onderstaand nummer:

015 123 004

Voor spoedgevallen in het weekend richt u zich tot de oogarts van wacht via het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Ook via mail kan u ons steeds contacteren.

info@oogartsenpraktijkhob.be

Wenst u meer informatie over onze andere behandelingen? Dan verwijzen we u graag door naar onze website.

www.oogartsenpraktijkhob.be




Via deze folder willen wij u informeren omtrent ooglidcorrecties. Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek dat u met ons heeft gehad.

Dermatochalasis

Een huidteveel in de boven- of onderoogleden wordt dermatochalasis genoemd. De belangrijkste oorzaak is het bindweefsel dat zijn elasticiteit verliest, waardoor de huid steeds meer gaat overhangen. De huid wordt dunner en gevoelig voor vochtophoping.

Laagstand van het bovenooglid en wenkbrauw

Een huidteveel van de bovenoogleden kan gepaard gaan met een laagstand van het bovenooglid en/of een laagstand van de wenkbrauw. Deze afwijkingen worden op een andere manier chirurgisch gecorrigeerd. Soms is het nodig dit gelijktijdig of voorafgaand te behandelen, omdat een operatie van het huidteveel alleen onvoldoende resultaat oplevert.



Behandeling

Hangende oogleden veroorzaken een beperking van het gezichtsveld, waardoor hoofdpijn en vermoeide ogen ontstaan. Een ooglidcorrectie oftewel blefaroplastiek kan een oplossing bieden voor deze problemen. Bij iedere patiënt wordt bepaald wat en hoeveel van de huid en onderliggende weefsels wordt weggehaald voor een optimaal resultaat.

De operatie vindt plaats onder lokale verdoving; men hoeft niet nuchter te zijn. De dag van de ingreep kan men niet met de wagen rijden.

Nazorg

De eerste week na de ingreep dient fysieke inspanning vermeden te worden, andere dagdagelijkse activiteiten zijn geen probleem. Pijnstilling is meestal niet nodig. Men kan bijna altijd de dag na de ingreep weer met de wagen rijden. Na een week worden de hechtingen verwijderd. Lokale zwelling en bloeditstorting zijn na twee weken grotendeels verdwenen.

